

※保育所（園）は乳幼児が長時間生活を共にする場です。感染症の集団での感染や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子ども達が1日快適に生活できることが大切です。

※園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育所（園）での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

< 保護者記入用 >

登園届（保護者記入）			
つばさ保育園長殿	<div style="text-align: right;"> 児童氏名 _____ 生年月日 年 月 日 _____ </div>		
年 月 日（病名） _____ と			
医療機関名 _____ において診断され、 登園のめやすを参考に、症状が回復すれば、登園可能と診断されています。			
_____ 年 月 日 症状が回復し、 集団生活に支障がない状態となりましたので登園いたします。			
保護者氏名			印（またはサイン）

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届けが必要な感染症

病名	症状	感染しやすい期間	登園のめやす
ようれんきんかんせんしゅう 溶連菌感染症	発熱と喉の痛み(3歳未満は熱があ がらないことも)赤い疱疹、イチゴ舌 など	適切な抗菌薬治療を開始する前 と開始後1日間	抗菌薬内服後24～48時間経 過していること
マイコプラズマ肺炎	発熱、咳(夜中に多く発症する)	適切な後抗菌薬治療を開始する 前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まってい ること
手足口病	発熱(微熱程度)食欲不振、手のひ ら、足の裏などの疱疹、口腔内に水 泡	手足や口腔内に水泡・潰瘍 <small>かいよう</small> が発 症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の 影響がなく、普段の食事がとれ ること
伝染性紅斑 (りんご病)	リンゴのような頬の赤み、手足にレー ス状の発疹	発疹出現前の一週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイ ルス等)	吐き気、嘔吐、軟便～水様便 食欲不振、胃痛など	症状のある間と、症状消失後1週 間(量は減少していくが、数週間ウ イルスを排泄しているので注意が 必要)	嘔吐、下痢などの症状が治ま り、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	発熱(高熱)、口蓋垂(のどちんこ) 周辺の小水泡、咳、鼻水などの風 症状	発症前の2日前から2～3週間(1 か月程ウイルスを排泄しているの で注意が必要)	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の 影響がなく、普段の食事がとれ ること
RSウイルス感染症	発熱、咳、鼻水などの風邪症状 ぜんめい 喘鳴(ゼイゼイ)、多呼吸など	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状 態が良いこと
带状疱疹	体の左右どちらか片方に帯のような すいほう 水泡(水泡ができると疼痛ともなう)	水泡が形成している間	全ての発疹が痂皮(かさぶた) 化してから
突発性疱疹	発熱、咳、鼻水などの風邪症状 (解熱とともに全身への発疹)	発症して、1週間程度	解熱し機嫌が良く、全身状態が 良いこと